

65歳以上の成人で接種を検討すべき ワクチン一覧

ワクチンの種類と接種法の概要

インフルエンザ

不活化ワクチン 皮下注射 年1回の定期接種

肺炎球菌

ニューモバックス[®] 皮下注射 65歳時に定期接種 5年後の2回目接種可
プレベナー20[®] 筋肉内注射 任意接種 繰り返し接種する必要はない
ニューモバックス[®]接種から1年以上あけての接種も推奨
キャップバックス[®] 筋肉内注射 任意接種 繰り返し接種する必要はない
ニューモバックス[®]接種から1年以上あけての接種も推奨

新型コロナウイルス

コミナティ[®], スパイクバックス[®], 筋肉内注射 いずれかのワクチンを年1回 定期接種
ダイチロナ[®], コスタイベ[®],
ヌバキソビッド[®]

帯状疱疹

シングリックス[®] 筋肉内注射 2から6か月の間隔をあけて2回接種する
乾燥弱毒生水痘ワクチン 皮下注射 単回
➢ いずれかのワクチンを65歳から5歳刻みの年齢時に定期接種
➢ 既に乾燥弱毒生水痘ワクチンの接種を受けた者へのシングリックス[®]接種可

RSウイルス

アレックスビー[®], アブリスボ[®] 筋肉内注射 単回 任意接種